



[Ф] Филиппов А.В. **Сборник задач по дифференциальным уравнениям.** – Москва-Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2002.

URL: <http://elibrary.bsu.az/kkitablar/846.pdf>

[М] Матвеев Н.М. **Сборник задач и упражнений по обыкновенным дифференциальным уравнениям.** – Минск: «Вышэйшая школа», 1987. [djvu](#)

7.02.2018

Занятие № 1

Уравнения, не разрешенные относительно производной. Особые решения



[Уравнения первого порядка, не разрешенные относительно производной](#)

Дифференциальное уравнение первого порядка, не разрешенное относительно производной, имеет вид

$$F\left(x, y, \frac{dy}{dx}\right) = 0 \quad (1)$$

При решении такого уравнения можно попытаться разрешить его относительно производной $\frac{dy}{dx}$, т.е. получить одно или несколько уравнений, разрешенных относительно производной:

$$\frac{dy}{dx} = f_i(x, y), \quad i = 1, 2, \dots, k. \quad (2)$$

Полученные уравнения решаются рассмотренными ранее методами.

Задача Коши для уравнения (1) с условием $y(x_0) = y_0$ имеет **единственное решение** (точка $(x_0; y_0)$ является *точкой един-*

ственности решения), если не существует двух интегральных кривых уравнения (1), которые бы проходили через точку $(x_0; y_0)$ и имели бы в этой точке общую касательную. В противном случае в точке $(x_0; y_0)$ единственность решения задачи Коши нарушается (точка $(x_0; y_0)$ является точкой неединственности решения задачи Коши).

Уравнения вида (1) могут иметь **особые** решения, т.е. такие решения, соответствующая интегральная кривая которых целиком состоит из точек неединственности.

Задание 1. Решить уравнение $(y')^2 - 1 = 0$ и нарисовать его интегральные кривые. Нарушается ли в каких-либо точках плоскости xOy единственность решения этого уравнения?

Для заданного уравнения имеем

$$(y')^2 - 1 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} y' = 1, \\ y' = -1. \end{cases}$$


Решениями уравнений являются соответственно два семейства функций:

$$y = x + C \text{ и } y = -x + C,$$

графики которых определяют два семейства интегральных кривых заданного уравнения (см. рис.). Через каждую точку $(x_0; y_0)$ плоскости xOy проходят две интегральные кривые заданного уравнения:

$$y - y_0 = x - x_0 \text{ и } y - y_0 = -x + x_0.$$

Так как эти интегральные кривые пересекаются под прямым углом, то единственность решения не нарушается.



Заданное уравнение равносильно совокупности двух уравнений:

$$y' = y \text{ и } y' = -y,$$

интегрируя которые найдем два семейства функций

$$y = Ce^x \text{ и } y = Ce^{-x}, \quad C \in R,$$

определяющих решения заданного уравнения. При $C = 0$ оба семейства определяют решение $y = 0$. Интегральные кривые заданного уравнения показаны на рис. 1.




Рис. 1. Интегральные кривые уравнения (241.1)

Через каждую точку $(x_0; y_0)$ плоскости xOy , за исключением принадлежащих оси x , проходят две интегральные кривые. Но так как касательные к интегральным кривым, проведенные в точке $(x_0; y_0)$, не совпадают, а через точки оси x проходит одна интегральная кривая, то все точки плоскости являются точками единственности.

Ответ: $y = Ce^{\pm x}, \quad C \in R.$

Разрешив заданное уравнение относительно производной, получим уравнение

$$y' = \frac{3}{2} y^{1/3}.$$

Очевидно, $y = 0$ является решением. Остальные решения найдем, применяя метод разделения переменных:

$$\frac{2}{3} \frac{dy}{y^{1/3}} = dx, \quad y^{2/3} = x + C, \quad y^2 = (x + C)^3, \quad C \in R.$$

Таким образом, заданное уравнение имеет решения:

$$y^2 = (x + C)^3, \quad C \in R, \quad y = 0.$$

Соответствующие им интегральные кривые показаны на рис. 2.




Рис. 2. Интегральные кривые уравнения (242.1)

Через каждую точку $(x_0; y_0)$ плоскости, за исключением принадлежащих оси x , проходит одна интегральная кривая. Решение $y = 0$ является особым.

Ответ: $y^2 = (x + C)^3, \quad C \in R, \quad y = 0.$

№ 244 [Ф]: $y^2((y')^2 + 1) = 1$

(244.1)

Заметим, что $y = 0$ не является решением заданного уравнения, для которого имеем

$$(y')^2 = \frac{1-y^2}{y^2} \Leftrightarrow y' = \pm \frac{\sqrt{1-y^2}}{y}, y \in [-1; 1].$$

Очевидно, $y = \pm 1$ – решения уравнения. Остальные решения находятся методом разделения переменных, получив общий интеграл

$$x + C = \pm \sqrt{1-y^2} \Leftrightarrow y^2 + (x+C)^2 = 1, C \in R.$$

Интегральные кривые заданного уравнения показаны на рис. 3.




Рис. 3. Интегральные кривые уравнения (244.1)

Через каждую точку $(x_0; y_0)$ плоскости, ограниченной прямыми $y = \pm 1$ проходят две интегральные кривые. Но только точки на прямых $y = \pm 1$ и $y = 0$ являются точками неединственности. Решения $y = \pm 1$ являются особыми.

Ответ: $(x + C)^2 + y^2 = 1, C \in R, y = \pm 1.$



Домашнее задание

[Ф] №№ 243, 246.

[М] № 524

$$(y')^2 = 4|y|$$

[М] № 527

$$(y')^3 - \frac{y'}{4x} = 0$$

14.02.2018

Занятие № 2

Уравнения, не разрешенные относительно производной. Особые решения

$$\text{№ 249 [Ф]: } (y')^3 + y^2 = yy'(y'+1) \quad (249.1)$$

Для заданного уравнения имеем

$$(y')^3 + y^2 = yy'(y'+1), \quad (y')^3 - y(y')^2 + y^2 - yy' = 0,$$

$$(y')^2(y'-y) - y(y'-y) = 0, \quad (y'-y)((y')^2 - y) = 0.$$

Получаем, что уравнение (249.1) равносильно совокупности следующих уравнений:

$$\left[\begin{array}{l} y'-y = 0, \end{array} \right. \quad (1)$$

$$\left[\begin{array}{l} y' = \sqrt{y}, \quad y \geq 0, \end{array} \right. \quad (2)$$

$$\left[\begin{array}{l} y' = -\sqrt{y}, \quad y \geq 0. \end{array} \right. \quad (3)$$

Интегрируя первое, найдем его общее решение

$$y = Ce^x, \quad C \in R.$$

Интегрируя два других, найдем

$$2\sqrt{y} = \pm(x + C), \quad y = 0.$$

Так как

$$2\sqrt{y} = \pm(x+C) \Leftrightarrow y = \frac{(x+C)^2}{4}, \quad (4)$$

то нетрудно установить, что семейство парабол (4) имеет огибающую $y = 0$, которая является особым решением уравнений (2) и (3), а, следовательно, и особым решением заданного уравнения (249.1). (Заметим, что решение $y = 0$ является частным для уравнения (1)).

Интегральные кривые заданного уравнения показаны на рис. 4.




Рис. 4. Интегральные кривые уравнения (249.1)

Ответ: $y = Ce^x$, $4y = (x+C)^2$, $C \in \mathbb{R}$; $y = 0$ – особое решение.

№ 251 [Ф]: $(y')^2 + xy = y^2 + xy'$

(251.1)

Для заданного уравнения имеем

$$(y')^2 + xy = y^2 + xy', \quad (y')^2 - y^2 = x(y' - y),$$
$$(y' - y)(y' + y - x) = 0.$$

Полученное уравнение равносильно совокупности двух линейных уравнений:

$$\begin{cases} y' - y = 0, & (1) \\ y' + y - x = 0. & (2) \end{cases}$$

Уравнение (1) является уравнением с разделяющимися переменными и имеет общее решение

$$y = Ce^x, \quad C \in R.$$

Уравнение (2) является линейным неоднородным и может быть решено, например, сведением к уравнению с разделяющимися переменными заменой $u = x - y$. Общим решением уравнения (2) является

$$y = Ce^{-x} + x - 1, \quad C \in R.$$

Оба найденных решений дают множество решений заданного уравнения. Его общий интеграл можно записать в виде:

$$(y - Ce^x)(y - Ce^{-x} - x + 1) = 0, \quad C \in R.$$

Можно показать, что заданное уравнение не имеет особых решений, используя следующий способ.

Пусть функция $F = F(x, y, y')$ непрерывна и имеет непрерывные частные производные первого порядка $\frac{\partial F}{\partial y}$ и $\frac{\partial F}{\partial y'}$. Геометрическое место точек $\varphi(x, y) = 0$, получаемых путем исключения y' из уравнений

$$F(x, y, y') = 0, \quad \frac{\partial F(x, y, y')}{\partial y'} = 0,$$

Называется *дискриминантной кривой* дифференциального уравнения $F(x, y, y') = 0$. Следует проверить, является ли дискрими-

нантная кривая, удовлетворяющая этому уравнению, особым решением, т. е. касаются ли ее в каждой точке другие решения.

Для рассматриваемого уравнения (251.1) условия для определения дискриминантной кривой имеют вид

$$\begin{cases} F(x, y, y') = (y')^2 + xy - y^2 - xy' = 0, \\ \frac{\partial F}{\partial y'} = 2y' - x = 0, \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y' = \frac{x}{2}, \\ y = \frac{x}{2}. \end{cases}$$

Несовместность полученных условий позволяет сделать вывод, что нет дискриминантных кривых, удовлетворяющих заданному уравнению. Следовательно, и нет особых решений.

Интегральные кривые заданного уравнения (251.1) показаны на рис. 5.




Рис. 5. Интегральные кривые уравнения (251.1)

Ответ: $y = Ce^x$, $y = Ce^{-x} + x - 1$.

№ 528 [М]: Проинтегрировать уравнение

$$(y')^3 - x(y')^2 - 4yy' + 4xy = 0 \quad (528.1)$$

Выделить интегральные кривые, проходящие через точки $M_1(0;1)$, $M_2(1; 0)$, $M_3(0; 0)$.

Разрешим заданное уравнение относительно y' :

$$(y')^2(y'-x) - 4y(y'-x) = 0 \Leftrightarrow (y'-x)((y')^2 - 4y) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} y'-x = 0, & (1) \\ y' = 2\sqrt{y}, \quad y \geq 0, & (2) \\ y' = -2\sqrt{y}, \quad y \geq 0. & (3) \end{cases}$$

Интегрируя первое, найдем его общее решение

$$y = \frac{x^2}{2} + C, \quad C \in \mathbb{R}.$$

Интегрируя два других, найдем

$$\sqrt{y} = \pm(x + C), \quad y = 0.$$

Так как

$$\sqrt{y} = \pm(x + C) \Leftrightarrow y = (x + C)^2, \quad (4)$$

и семейство парабол (4) имеет огибающую $y = 0$, то $y = 0$ является особым решением заданного уравнения.

Таким образом установили все решения заданного уравнения:

- 1) семейство парабол $y = \frac{x^2}{2} + C$,
- 2) семейство правых ветвей парабол $y = (x + C)^2$,
- 3) семейство левых ветвей парабол $y = (x + C)^2$,
- 4) особое решение $y = 0$.

Интегральные кривые заданного уравнения показаны на рис. 6.




Рис. 6. Интегральные кривые уравнения (528.1)

Через точку $M_1(0;1)$ проходят следующие интегральные кривые из первых трех семейств (рис. 7):

$$y = \frac{x^2}{2} + 1; \quad y = (x+1)^2, \quad x \geq -1; \quad y = (x-1)^2, \quad x \leq 1.$$

При этом для каждой интегральной кривой соответственно имеем:

$$y'(0) = \frac{d}{dx} \left(\frac{x^2}{2} + 1 \right) \Big|_{x=0} = 0, \quad y'(0) = \frac{d}{dx} (x+1)^2 \Big|_{x=0} = 2,$$

$$y'(0) = \frac{d}{dx} (x-1)^2 \Big|_{x=0} = -2.$$

Точка $(x_0; y_0)$ является точкой единственности уравнения

$$F(x, y, y') = 0, \quad (*)$$

если можно указать такую окрестность точки $(x_0; y_0)$, через каж-

дую точку которой проходит столько интегральных кривых уравнения (*), сколько направлений поля определяется уравнением (*) в точке $(x_0; y_0)$.

Вывод: точка $M_1(0;1)$ – точка единственности (рис. 7).




Рис. 7. Интегральные кривые уравнения (528.1), проходящие через точку M_1

Через точку $M_2(1;0)$ проходят следующие интегральные кривые из перечисленного выше множества (рис. 8):

$$y = \frac{x^2 - 1}{2}; \quad y = (x-1)^2, x \leq 1; \quad y = (x-1)^2, x \geq 1; \quad y = 0.$$

Т.е. через точку M_2 проходят 4 интегральные кривые, но при этом для каждой интегральной кривой соответственно имеем:

$$y'(1) = \frac{d}{dx} \left(\frac{x^2 - 1}{2} \right) \Big|_{x=1} = 1, \quad y'(1) = \frac{d}{dx} (x-1)^2 \Big|_{x=1} = 0,$$

$$y'(1) = \frac{d}{dx} (x-1)^2 \Big|_{x=1} = 0, \quad y'(1) = 0.$$

Вывод: так как в точке M_2 определено два различных направления, а не 4, то точка не является точкой единственности (рис. 8).




Рис. 8. Интегральные кривые уравнения (528.1), проходящие через точку M_2

Через точку $M_3(0;0)$ проходят следующие интегральные кривые (рис. 9):

$$y = \frac{x^2}{2}; \quad y = x^2, \quad x \geq 0; \quad y = x^2, \quad x \leq 0; \quad y = 0.$$




Рис. 9. Интегральные кривые уравнения (528.1), проходящие через точку M_3

Через точку M_3 проходит не одна интегральная кривая, но для каждой через эту точку проходит одна и та же касательная $y = 0$.

Вывод: точка M_3 не является точкой единственности.

Ответ: $y = \frac{x^2}{2} + C, \quad y = (x + C)^2, \quad C \in R, \quad y = 0.$



Домашнее задание

[Ф] №№ 252, 255, 307.

21.02.2018

Занятие № 3

Уравнения, не разрешенные относительно производной. Метод введения параметра

Не всегда уравнение

$$F(x, y, y') = 0 \quad (1)$$

разрешается относительно производной y' , а, если и разрешается, то не всегда полученные при этом уравнения $y' = f_i(x, y)$ легко интегрируются. В этих случаях для решения уравнения (1) можно применить **метод введения параметра**. Он позволяет свести уравнение (1) к уравнению, разрешенному относительно производной. Рассмотрим вариант этого метода для случая, когда уравнение (1) легко разрешается относительно y или относительно x ¹.

1. Пусть уравнение (1) можно привести к виду $x = f(y')$. Тогда введя параметр $p = y'$, будем иметь

$$x = f(y') \Leftrightarrow \begin{cases} dy = p dx, \\ x = f(p). \end{cases}$$

¹ Другие варианты применения метода см., например, в кн.: Степанов В.В. Курс дифференциальных уравнений. – М.: Едиториал УРСС, 2004 (гл. III, § 2).

При этом

$$dy = pd(f(p)), \quad dy = pf'(p)dp.$$

Интегрируя полученное уравнение, найдем

$$y = \int pf'(p)dp + C.$$

В результате получаем решения исходного уравнения в параметрическом виде:

$$\begin{cases} x = f(p), \\ y = \int pf'(p)dp + C. \end{cases}$$

Если возможно, то исключаем параметр, получив общее решение рассматриваемого уравнения в одном из следующих видов:

$$\Phi(x, y, C) = 0, \quad y = \varphi(x, C), \quad x = \varphi(y, C).$$

2. Пусть уравнение (1) можно привести к виду $y = f(y')$. Тогда введя параметр $p = y'$, будем иметь

$$y = f(y') \Leftrightarrow \begin{cases} dy = p dx, \\ y = f(p). \end{cases}$$

При этом

$$d(f(p)) = p dx \quad f'(p)dp = p dx.$$

Интегрируя полученное уравнение, найдем

$$x = \int \frac{f'(p)}{p} dp + C.$$

В результате получаем решение исходного уравнения в параметрическом виде:

$$\begin{cases} x = \int \frac{f'(p)}{p} dp + C, \\ y = f(p). \end{cases}$$

Если $p = 0$ является решением уравнения $f'(p)dp = p dx$, то к найденному решению следует добавить и решение $y = f(0)$.

3. Пусть уравнение (1) можно привести к виду $x = f(y, y')$. Тогда введя параметр $p = y'$, будем иметь

$$x = f(x, y') \Leftrightarrow \begin{cases} dy = p dx, \\ x = f(y, p). \end{cases}$$

При этом

$$dy = pd(f(y, p)), \quad dy = p \left(\frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial p} dp \right).$$

Если найдем решения полученного уравнения в виде $y = \Phi(x, C)$, то решение исходного уравнения получим в параметрическом виде:

$$\begin{cases} x = f(y, p), \\ y = \Phi(p, C). \end{cases}$$

Аналогичные рассуждения проводятся и в случае, когда уравнение (1) можно привести к виду $y = f(x, y')$.

№ 267 [Ф]: $x = (y')^3 + y'$.

(267.1)

Введя параметр $p = y'$, будем иметь:

$$\begin{cases} dy = p dx, & \begin{cases} dy = pd(p^3 + p) = (3p^3 + p)dp, \\ x = p^3 + p, & x = p^3 + p, \end{cases} \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = p^3 + p, \\ y = \frac{3}{4}p^4 + \frac{1}{2}p^2 + C. \end{cases}$$

Ответ: $x = p^3 + p, \quad 4y = 3p^4 + 2p^2 + C, \quad C \in \mathbb{R}.$

№ 272 [Ф]: $y = \ln(1 + (y')^2).$

(272.1)

1 способ. Введя параметр $p = y'$, будем иметь:

$$\begin{cases} dy = p dx \\ y = \ln(1 + p^2), \end{cases} \quad \begin{cases} d(\ln(1 + p^2)) = p dx, \\ y = \ln(1 + p^2), \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{2p}{1 + p^2} dp = p dx, \\ y = \ln(1 + p^2). \end{cases}$$

Решая уравнение $\frac{2p}{1 + p^2} dp = p dx$, найдем:

$$p = 0; \quad x = 2 \operatorname{arctg} p + C.$$

Следовательно, получили следующие решения заданного уравнения:

$$\begin{cases} p = 0, \\ x = 2 \operatorname{arctg} p + C, \\ y = \ln(1 + p^2), \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \operatorname{arctg} p + C, \\ y = \ln(1 + p^2), \\ y = \ln(1) = 0. \end{cases}$$

Ответ: $x = 2 \operatorname{arctg} p + C, \quad y = \ln(1 + p^2), \quad C \in \mathbb{R}; \quad y = 0.$

Замечание: Решение можно записать и в явной форме, исключив параметр p следующим образом. Имеем

$$x = 2 \operatorname{arctg} p + C, \quad \begin{cases} p = \operatorname{tg} \frac{x - C}{2}, \\ -\pi \leq x - C \leq \pi, \end{cases}$$

$$\text{тогда } y = \ln \left(1 + \left(\operatorname{tg} \frac{x - C}{2} \right)^2 \right) = -2 \ln \left(\left| \cos \left(\frac{x - C}{2} \right) \right| \right), \quad |x - C| \leq \pi.$$

Здесь была использована формула $1 + \operatorname{tg}^2(\alpha) = \frac{1}{\cos^2 \alpha}$.

2 способ. Разрешим заданное уравнение относительно производной, получим

$$y' = \pm(\sqrt{e^y - 1}), \quad y \geq 0.$$

Очевидно, $y = 0$ является решением. Остальные решения найдем, разделяя переменные:

$$\frac{dy}{\sqrt{e^y - 1}} = \pm dx, \quad \int \frac{dy}{\sqrt{e^y - 1}} = \pm x + C.$$


Так как при $y > 0$

$$\int \frac{dy}{\sqrt{e^y - 1}} = 2 \operatorname{arctg} \sqrt{e^y - 1} + C,$$

то решения рассматриваемой пары уравнений, учитывая, что $y > 0$, можно записать следующим образом:

$$2 \operatorname{arctg} \sqrt{e^y - 1} = \pm x + C. \quad (272.1)$$

Ответ: $2 \operatorname{arctg} \sqrt{e^y - 1} = \pm x + C, y > 0; y = 0.$



Интегральные кривые уравнения (272.1)
(прямая $y = 0$ – особое решение, является огибающей семейства кривых (272.2))


№ 274 [Ф]: $y = (y' - 1)e^{y'}. \quad (274.1)$

Введя параметр $p = y'$, будем иметь:

$$\begin{cases} dy = p dx, \\ y = (p - 1)e^p, \end{cases} \quad \begin{cases} d((p - 1)e^p) = p dx, \\ y = (p - 1)e^p, \end{cases} \quad \begin{cases} p e^p dp = p dx, \\ y = (p - 1)e^p \end{cases}$$

$$\begin{cases} p = 0, \\ x = e^p + C, \\ y = (p-1)e^p, \end{cases} \quad \begin{cases} x = e^p + C, \\ y = (p-1)e^p; \\ y = -1. \end{cases}$$

Ответ: $x = e^p + C, y = (p-1)e^p, C \in R; y = -1.$



Интегральные кривые уравнения (274.1)
(прямая $y = -1$ – особое решение, является огибающей семейства кривых)

№ 278 [Ф]: $(y')^2 - 2xy' = x^2 - 4y.$ (278.1)

Разрешив уравнение относительно y и введя параметр $p = y'$, будем иметь

$$\begin{cases} dy = p dx, \\ y = \frac{1}{4}(x^2 + 2xp - p^2). \end{cases}$$

Подставляя второе уравнение в первое, получим

$$\frac{1}{4}(2x dx + 2p dx + 2x dp - 2p dp) = p dx, \quad (x - p)(dx + dp) = 0.$$

Тогда одно решение заданного уравнения получим при $p = x$:


$$y = \frac{1}{4}(x^2 + 2x^2 - x^2) = \frac{x^2}{2}.$$

Остальные решения находим, когда $dx + dp = 0$:

$$\begin{cases} dx + dp = 0, \\ y = \frac{1}{4}(x^2 + 2xp - p^2). \end{cases} \quad \begin{cases} p = -x + C, \\ y = \frac{1}{4}(x^2 + 2xp - p^2). \end{cases}$$

Отсюда получим $4y = (C^2 - 2(x - C)^2)$.

Ответ: $4y = C^2 - 2(x - C)^2, C \in R; 2y = x^2$.



Интегральные кривые уравнения (278.1)
(парабола $2y = x^2$ — огибающая семейства парабол $4y = C^2 - 2(x - C)^2$)

№ 283 [Ф]: $y' = e^{xy'/y}$.

(283.1)

Уравнение можно разрешить относительно x следующим образом:

$$y' = e^{xy'/y}, \quad \ln y' = \frac{xy'}{y}, \quad x = \frac{y \ln y'}{y'}.$$

Введя параметр $p = y'$ (заметим, что $y' > 0$), будем иметь:

$$\begin{cases} dy = p dx, \\ x = \frac{y \ln p}{p}. \end{cases}$$

Подстановка второго уравнения в первое дает

$$dy = pd\left(\frac{y \ln p}{p}\right), \quad dy = p\left(\frac{\ln p}{p} dy + y \frac{1 - \ln p}{p^2} dp\right),$$

$$(1 - \ln p)dy = y \frac{(1 - \ln p)}{p} dp, \quad (1 - \ln p)\left(dy - \frac{y}{p} dp\right) = 0.$$

Полученное уравнение распадается на два:

$$1 - \ln p = 0 \quad \text{и} \quad dy - \frac{y}{p} dp = 0.$$

Следовательно, имеем

$$\begin{cases} dy = pdx, \\ x = \frac{y \ln p}{p} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 1 - \ln p = 0, \\ dy - \frac{y}{p} dp = 0, \\ x = \frac{y \ln p}{p}, \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} p = e, \\ p = Cy, \\ x = \frac{y \ln p}{p}. \end{cases}$$

В результате получили следующие решения заданного уравнения:

$$ex = y \quad \text{и} \quad Cx = \ln(Cy).$$

Ответ: $Cx = \ln(Cy); \quad y = ex.$

№ 287 [Ф]: $y = xy' - (y')^2.$ (287.1)

Введя параметр $p = y'$, будем иметь:

$$\begin{cases} dy = pdx, \\ y = xp - p^2, \end{cases} \quad \begin{cases} d(xp - p^2) = pdx, \\ y = xp - p^2. \end{cases}$$

Для первого уравнения имеем


$$d(xp - p^2) = pdx, \quad xdp + pdx - 2pdp = pdx, \quad (x - 2p)dp = 0.$$

Полученное уравнение распадается на два $x - 2p = 0$ и $dp = 0$.

Следовательно,

$$\begin{cases} d(xp - p^2) = p dx, \\ y = xp - p^2, \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} p = \frac{x}{2}, \\ p = C, \\ y = xp - p^2. \end{cases}$$

Ответ: $y = Cx - C^2, C \in R; 4y = x^2.$



Интегральные кривые уравнения (287.1)
(парабола $4y = x^2$ – огибающая семейства прямых $y = Cx - C^2$)



Домашнее задание

[Ф] №№ 269, 271, 282.

Выполнить задания домашней контрольной работы на тему «Уравнения, не разрешенные относительно производной. Метод введения параметра». Срок сдачи работы **7 марта**. [Примерный вариант](#)