



[Ф] Филиппов А.В. **Сборник задач по дифференциальным уравнениям.** – Москва-Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2002.

URL: <http://elibrary.bsu.az/kitablar/846.pdf>

[М] Матвеев Н.М. **Сборник задач и упражнений по обыкновенным дифференциальным уравнениям.** – Минск: «Вышэйшая школа», 1987. [djvu](#)



[Занятие № 13](#)

05.05.2023

Занятие № 12

Системы линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами



[Интегрирование систем линейных дифференциальных уравнений](#)

I. Метод исключения неизвестных

Путем исключения неизвестных система сводится к дифференциальному уравнению более высокого порядка с одной неизвестной функцией.

$$\text{№ 786 [Ф]:} \quad \begin{cases} x' = 2x + y, \\ y' = 3x + 4y. \end{cases} \quad (786)$$

Выразив из первого уравнения y :

$$y = x' - 2x, \quad (786.1)$$

и подставив полученное для y выражение во второе уравнение системы, получим

$$(x' - 2x)' = 3x + 4(x' - 2x) \Leftrightarrow x'' - 6x' + 5x = 0.$$

Составим для полученного уравнения соответствующее характеристическое уравнение $\lambda^2 - 6\lambda + 5 = 0$. Его корнями будут $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 5$. Тогда $x = C_1 e^t + C_2 e^{5t}$. Подставляя выражение для x в (786.1), получим $y = (C_1 e^t + 5C_2 e^{5t}) - 2(C_1 e^t + C_2 e^{5t}) = -C_1 e^t + 3C_2 e^{5t}$.

Ответ: $x = C_1 e^t + C_2 e^{5t}, y = -C_1 e^t + 3C_2 e^{5t}$.

В матричной форме: $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = C_1 e^t \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + C_2 e^{5t} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$.

№ 788 [Ф]:
$$\begin{cases} x' + x - 8y = 0, \\ y' - x - y = 0. \end{cases} \quad (788)$$

Выразив из второго уравнения x :

$$x = y' - y, \quad (788.1)$$

и подставив полученное для x выражение в первое уравнение системы, получим

$$(y' - y)' + y' - y - 8y = 0 \Leftrightarrow y'' - 9y = 0.$$

Составим для полученного уравнения соответствующее характеристическое уравнение $\lambda^2 - 9 = 0$. Его корнями будут $\lambda_{1,2} = \pm 3$. Тогда $y = C_1 e^{3t} + C_2 e^{-3t}$. Подставляя выражение для y в (788.1), получим $x = 2C_1 e^{3t} - 4C_2 e^{-3t}$.

Ответ: $x = 2C_1 e^{3t} - 4C_2 e^{-3t}, y = C_1 e^{3t} + C_2 e^{-3t}$.

В матричной форме: $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = C_1 e^{3t} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} + C_2 e^{-3t} \begin{pmatrix} -4 \\ 1 \end{pmatrix}$.

№ 790 [Ф]:
$$\begin{cases} x' = x - 3y, \\ y' = 3x + y. \end{cases} \quad (790)$$

Выразив из второго уравнения x :

$$x = \frac{y' - y}{3}, \quad (790.1)$$

и подставив полученное для x выражение в первое уравнение системы, получим

$$y'' - 2y' + 10y = 0.$$

Составим для полученного уравнения соответствующее характеристическое уравнение $\lambda^2 - 2\lambda + 10 = 0$. Его корнями будут $\lambda_{1,2} = 1 \pm 3i$. Тогда $y = C_1 e^t \cos 3t + C_2 e^t \sin 3t$. Подставляя выражение для y в (790.1), получим $x = C_2 e^t \cos 3t - C_1 e^t \sin 3t$.

Ответ: $x = e^t (C_2 \cos 3t - C_1 \sin 3t), \quad y = e^t (C_1 \cos 3t + C_2 \sin 3t)$.



Домашнее задание

[Ф] №№ 787, 789.

Изучить материал по теме «[Фазовый портрет ЛДС](#)»

12.05.2023

Занятие № 13

Системы линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами



$$\text{№ 813 [Ф]:} \quad \begin{cases} x'' = 2x - 3y, \\ y'' = x - 2y. \end{cases} \quad (813)$$

Выразив из второго уравнения x :

$$x = y'' + 2y, \quad (813.1)$$

и подставив полученное выражение в первое уравнение системы, получим

$$(y'' + 2y)'' = 2(y'' + 2y) - 3y \Leftrightarrow y^{(4)} - y = 0.$$

Соответствующее характеристическое уравнение $\lambda^4 - 1 = 0$ имеет корни $\lambda_{1,2} = \pm 1$, $\lambda_{3,4} = \pm i$. Тогда $y = C_1 e^t + C_2 e^{-t} + C_3 \cos t + C_4 \sin t$.

Подставляя выражение для y в (813.1), получим $x = 3C_1 e^t + 3C_2 e^{-t} + C_3 \cos t + C_4 \sin t$.

Ответ:
$$\begin{cases} x = 3C_1 e^t + 3C_2 e^{-t} + C_3 \cos t + C_4 \sin t, \\ y = C_1 e^t + C_2 e^{-t} + C_3 \cos t + C_4 \sin t. \end{cases}$$

В матричной форме:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = C_1 e^t \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} + C_2 e^{-t} \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} + C_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \cos t + C_4 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \sin t.$$

$$\text{№ 832 [Ф]:} \quad \begin{cases} x' = 5x - 3y + 2e^{3t}, \\ y' = x + y + 5e^{-t}. \end{cases} \quad (832)$$

Выразив из второго уравнения x :

$$x = y' - y - 5e^{-t}, \quad (832.1)$$

и подставив полученное выражение в первое уравнение системы, после приведения подобных слагаемых получим уравнение

$$y'' - 6y' + 8y = 2e^{3t} - 30e^{-t}. \quad (832.2)$$

Характеристическое уравнение $\lambda^2 - 6\lambda + 8 = 0$ имеет корни $\lambda_1 = 2$, $\lambda_2 = 4$. Тогда общее решение соответствующего однородного уравнения $y'' - 6y' + 8y = 0$ имеет вид: $y_{\text{одн}} = C_1 e^{2t} + C_2 e^{4t}$. Частное решение неоднородного уравнения (832.2) можно найти методом неопределенных коэффициентов. При этом его следует искать в виде

$$y_u = Ae^{3t} + Be^{-t}. \quad (832.3)$$

Подстановка выражения (832.3) в (832.2) дает:

$$-Ae^{3t} + 15Be^{-t} = 2e^{3t} - 30e^{-t} \Rightarrow A = -2, B = -2.$$

Таким образом, получали общее решение уравнения (832.2)

$$y = C_1 e^{2t} + C_2 e^{4t} - 2e^{3t} - 2e^{-t}.$$

Подставляя выражение для y в (832.1), получим $x = C_1 e^{2t} + 3C_2 e^{4t} - 4e^{3t} - e^{-t}$.

Ответ:
$$\begin{cases} x = C_1 e^{2t} + 3C_2 e^{4t} - 4e^{3t} - e^{-t}, \\ y = C_1 e^{2t} + C_2 e^{4t} - 2e^{3t} - 2e^{-t}. \end{cases}$$

В матричной форме:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = C_1 e^{2t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + C_2 e^{4t} \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} - 2e^{3t} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} - e^{-t} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

№ 796 [Ф]:

$$\begin{cases} x' = x - y + z, \\ y' = x + y - z, \\ z' = 2x - y. \end{cases} \quad (796)$$

Выразив из первого уравнения y :

$$y = x + z - x', \quad (796.1)$$

и подставив полученное выражение для y во второе и третье уравнения заданной системы, получим

$$\begin{cases} x'' = 2x' + z' - 2x, \\ z' = x - z + x', \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x'' = 3x' - x - z, \\ z' = x - z + x'. \end{cases} \quad (796.2)$$

Выразив z из первого уравнения системы (966.2):

$$z = 3x' - x - x'', \quad (796.3)$$

из второго уравнения системы (796.2) исключим переменную z . В результате получим уравнение

$$x''' - 2x'' - x' + 2x = 0. \quad (796.4)$$

Соответствующее характеристическое уравнение

$$\lambda^3 - 2\lambda^2 - \lambda + 2 = 0 \Leftrightarrow (\lambda - 2)(\lambda^2 - 1) = 0$$

имеет корни $\lambda_1 = 2$, $\lambda_{2,3} = \pm 1$. Следовательно, общим решением уравнения (796.4) будет

$$x = C_1 e^{2t} + C_2 e^t + C_3 e^{-t}. \quad (796.5)$$

Подставив (796.5) в (796.3), найдем

$$z = C_1 e^{2t} + C_2 e^t - 5C_3 e^{-t}. \quad (796.6)$$

Подставив (796.5) и (796.6) в (796.1), найдем

$$y = C_2 e^t - 3C_3 e^{-t}.$$

Ответ:

$$\begin{cases} x = C_1 e^{2t} + C_2 e^t + C_3 e^{-t}, \\ y = C_2 e^t - 3C_3 e^{-t}, \\ z = C_1 e^{2t} + C_2 e^t - 5C_3 e^{-t}. \end{cases}$$

II. Метод Эйлера (метод собственных векторов)

Систему линейных однородных дифференциальных уравнений, разрешенных относительно производных,

При этом функции $X_i(t) = e^{\lambda_i t} h^i$, $i = \overline{1, n}$, образуют фундаментальную систему решений уравнения (2).

№ 796 [Ф]:

$$\begin{cases} x' = x - y + z, \\ y' = x + y - z, \\ z' = 2x - y. \end{cases} \quad (796)$$

Найдем собственные значения матрицы системы $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix}$,

построив соответствующее характеристическое уравнение:

$$|A - \lambda E| = 0 \Leftrightarrow (\lambda - 1)(\lambda + 1)(\lambda - 2) = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 1, \lambda_2 = -1, \lambda_3 = 2.$$

Для каждого собственного значения найдем соответствующий собственный вектор, решая уравнение $Ah^i = \lambda_i h^i$.

1) Для $\lambda_1 = 1$ и $h^1 = (a, b, c)^T$ имеем:

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} -b + c = 0, \\ a - c = 0, \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = c, \\ a = c. \end{cases}$$

Полагая $c = 1$, получим $h^1 = (1, 1, 1)^T$.

2) Для $\lambda_2 = -1$ и $h^2 = (a, b, c)^T$ имеем:

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} 2a - b + c = 0, \\ 3a + b = 0, \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = -3a, \\ c = -5a. \end{cases}$$

Полагая $a = 1$, получим $h^2 = (1, -3, -5)^T$.

3) Для $\lambda_3 = 2$ и $h^3 = (a, b, c)^T$ имеем:

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} -a - b + c = 0, \\ a - b - c = 0, \\ 2a - b - 2c = 0, \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = c, \\ b = 0. \end{cases}$$

Полагая $c = 1$, получим $h^3 = (1, 0, 1)^T$.

В соответствии с [правилом 1](#) по формуле (4) запишем общее решение заданного уравнения:

$$\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix} = C_1 e^t \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + C_2 e^{-t} \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ -5 \end{pmatrix} + C_3 e^{2t} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C_1 e^t + C_2 e^{-t} + C_3 e^{2t} \\ C_1 e^t - 3C_2 e^{-t} \\ C_1 e^t - 5C_2 e^{-t} + C_3 e^{2t} \end{pmatrix}.$$

Ответ:

$$x = C_1 e^t + C_2 e^{-t} + C_3 e^{2t}, \quad y = C_1 e^t - 3C_2 e^{-t}, \quad z = C_1 e^t - 5C_2 e^{-t} + C_3 e^{2t}.$$



Домашнее задание

[Ф] №№ 814, 843, 799.

Подготовка к контрольной работе № 3 (часть 1).

[Примерный вариант](#)

Контрольная работа – **19 мая**.

Задания для самостоятельного изучения

№ 798 [Ф]:

$$\begin{cases} x' = 2x - y + z, \\ y' = x + 2y - z, \\ z' = x - y + 2z. \end{cases} \quad (798)$$

Найдем собственные значения матрицы системы $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$,

построив соответствующее характеристическое уравнение:

$$|A - \lambda E| = 0 \Leftrightarrow (\lambda - 1)(\lambda - 2)(\lambda - 3) = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 3.$$

Для каждого собственного значения найдем соответствующий собственный вектор, решая уравнение $Ah^i = \lambda_i h^i$.

1) Для $\lambda_1 = 1$ и $h^1 = (a, b, c)^T$ имеем:

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} a - b + c = 0, \\ a + b - c = 0, \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 0, \\ c = b. \end{cases}$$

Полагая $b = 1$, получим $h^1 = (0, 1, 1)^T$.

2) Для $\lambda_2 = 2$ и $h^2 = (a, b, c)^T$ имеем:

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = 2 \cdot \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} -b + c = 0, \\ a - c = 0, \\ a - b = 0, \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = c, \\ b = c. \end{cases}$$

Полагая $c = 1$, получим $h^2 = (1, 1, 1)^T$.

3) Для $\lambda_3 = 3$ и $h^3 = (a, b, c)^T$ имеем:

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = 3 \cdot \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} -a - b + c = 0, \\ a - b - c = 0, \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = 0, \\ a = c. \end{cases}$$

Полагая $c = 1$, получим $h^3 = (1, 0, 1)^T$.

В соответствии с [правилом 1](#) по формуле (4) запишем общее решение заданного уравнения:

$$\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix} = C_1 e^t \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + C_2 e^{2t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + C_3 e^{3t} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C_2 e^{2t} + C_3 e^{3t} \\ C_1 e^t + C_2 e^{2t} \\ C_1 e^t + C_2 e^{2t} + C_3 e^{3t} \end{pmatrix}.$$

Ответ: $x = C_2 e^{2t} + C_3 e^{3t}$, $y = C_1 e^t + C_2 e^{2t}$, $z = C_1 e^t + C_2 e^{2t} + C_3 e^{3t}$.

Если среди собственных чисел матрицы A имеются комплексные числа, то строится соответствующее такому собственному числу решение системы (2) через комплексные функции. Чтобы выразить решение через вещественные функции (в случае вещественной матрицы A), надо воспользоваться тем, что вещественная и мнимая части комплексного решения, соответствующего собственному числу $\lambda = \alpha \pm i\beta$ ($\beta \neq 0$), являются линейно независимыми решениями.

№ 801 [Φ]:

$$\begin{cases} x' = x - y - z, \\ y' = x + y, \\ z' = 3x + z. \end{cases} \quad (801)$$

Найдем собственные значения матрицы системы $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}$,

построив соответствующее характеристическое уравнение:

$$|A - \lambda E| = 0 \Leftrightarrow (\lambda - 1)(\lambda^2 - 2\lambda + 5) = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 1, \lambda_{2,3} = 1 \pm 2i.$$

Найдем соответствующие собственные вектора.

1) Для $\lambda_1 = 1$ и $h^1 = (a, b, c)^T$ имеем:

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} a - b - c = a, \\ a + b = b, \\ 3a + c = c, \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 0, \\ c = -b. \end{cases}$$

Полагая $b = 1$, получим $h^1 = (0, 1, -1)^T$. Тогда решением системы (801), соответствующим $\lambda_1 = 1$, будет вектор-функция $X_1(t) = e^t h^1$.

2) Для $\lambda_2 = 1 + 2i$ и $h^2 = (a, b, c)^T$ имеем:

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = (1 + 2i) \cdot \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 2ib, \\ 3a = 2ic. \end{cases}$$

Полагая $a = 2i$, получим $h^2 = (2i, 1, 3)^T$. Собственному значению $\lambda_2 = 1 + 2i$ соответствует комплексное решение системы (803)

$X_2(t) = e^{(1+2i)t} h^2$. Выделим в нем вещественную и мнимую части:

$$e^{(1+2i)t} \begin{pmatrix} 2i \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} = e^t (\cos 2t + i \sin 2t) \begin{pmatrix} 2i \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} = e^t \begin{pmatrix} -2 \sin 2t \\ \cos 2t \\ 3 \cos 2t \end{pmatrix} + i e^t \begin{pmatrix} 2 \cos 2t \\ \sin 2t \\ 3 \sin 2t \end{pmatrix}.$$

Таким образом, построены три вещественных линейно независимых решения заданной системы и их линейная комбинация с произвольными коэффициентами дает ее общее решение:

$$\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix} = C_1 e^t \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} + C_2 e^t \begin{pmatrix} -2 \sin 2t \\ \cos 2t \\ 3 \cos 2t \end{pmatrix} + C_3 e^t \begin{pmatrix} 2 \cos 2t \\ \sin 2t \\ 3 \sin 2t \end{pmatrix}.$$

Ответ:

$$\begin{aligned} x &= e^t (-2C_2 \sin 2t + 2C_3 \cos 2t), \quad y = e^t (C_1 + C_2 \cos 2t + C_3 \sin 2t), \\ z &= e^t (-C_1 + 3C_2 \cos 2t + 3C_3 \sin 2t). \end{aligned}$$

№ 817 [Φ]:
$$\begin{cases} 2x' - 5y' = 4y - x, \\ 3x' - 4y' = 2x - y. \end{cases} \quad (817)$$

Система (817) не приведена к нормальному виду, но ее также можно решить методом Эйлера.

Будем искать ее ненулевое решение в виде:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Ae^{\lambda t} \\ Be^{\lambda t} \end{pmatrix}. \quad (817.1)$$

Подставив (817.1) в заданную систему, будем иметь:

$$\begin{cases} 2A\lambda e^{\lambda t} - 5B\lambda e^{\lambda t} = 4Be^{\lambda t} - Ae^{\lambda t}, \\ 3A\lambda e^{\lambda t} - 4B\lambda e^{\lambda t} = 2Ae^{\lambda t} - Be^{\lambda t}, \end{cases} \Leftrightarrow \Leftrightarrow \begin{cases} (2\lambda - 1)A - (5\lambda + 4)B = 0, \\ (3\lambda - 2)A - (4\lambda + 1)B = 0. \end{cases} \quad (817.2)$$

Система (817.2) – система линейных однородных уравнений относительно коэффициентов A и B . Она будет иметь ненулевое решение, если определитель матрицы системы равен нулю:

$$\begin{vmatrix} 2\lambda - 1 & -(5\lambda + 4) \\ 3\lambda - 2 & -(4\lambda + 1) \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow \lambda^2 - 1 = 0.$$

Построенное уравнение является характеристическим для заданной системы и имеет корни $\lambda_1 = 1$ и $\lambda_2 = -1$. Подставив последователь-

но каждый из них в систему (817.2), найдем соответствующие им решения, и, следовательно, два линейно независимых решения вида (817.1) для заданной системы.

1) Для $\lambda = \lambda_1 = 1$ система (817.2) равносильна уравнению $A - B = 0$.

Тогда $A = B$, и полагая $A = 1$, получим

$$X_1 = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^t \\ e^t \end{pmatrix}.$$

2) Для $\lambda = \lambda_2 = -1$ будем иметь $B = 3A$. Полагая $A = 1$, получим

$$X_2 = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{-t} \\ 3e^{-t} \end{pmatrix}.$$

Общее решение заданной системы является линейной комбинацией найденных решений X_1 и X_2 .

Ответ: $x = C_1 e^t + C_2 e^{-t}$, $y = C_1 e^t + 3C_2 e^{-t}$.

Правило 2. Если для собственного значения λ кратности k имеется только m ($m < k$) линейно независимых собственных векторов, то решение, соответствующее такому λ , можно искать в виде:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} P_{k-m}^1(t) \\ P_{k-m}^2(t) \\ \vdots \\ P_{k-m}^n(t) \end{pmatrix} \cdot e^{\lambda t}, \quad (5)$$

где $P_{k-m}^i(t)$ – многочлены порядка $m - k$ с неизвестными коэффициентами. Коэффициенты многочленов определяются путем подстановки выражений (5) в систему (1). Приравняв коэффициенты при одинаковых степенях t в правой и левой частях уравнений, получим систему линейных уравнений относительно всех коэффициентов. Надо найти ее общее решение. **Коэффициенты многочленов должны зависеть от k произвольных постоянных.**

№ 808 [Ф]:

$$\begin{cases} x' = x - y + z, \\ y' = x + y - z, \\ z' = 2z - y. \end{cases} \quad (808)$$

Для матрицы системы $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ характеристическим урав-

нением будет уравнение $(1-\lambda)^2(2-\lambda)=0$. Матрица A имеет простое собственное значение $\lambda_1 = 2$ и собственное значение $\lambda_2 = 1$ кратности $k = 2$.

1) Для $\lambda_1 = 2$ и $h^1 = (a, b, c)^T$ имеем:

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = 2 \cdot \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} a - b + c = 2a, \\ a + b - c = 2b, \\ -b + 2c = 2c, \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = 0, \\ a = c. \end{cases}$$

Полагая $c = 1$, получим $h^1 = (1, 0, 1)^T$. Тогда решением системы (808), соответствующим $\lambda_1 = 2$, будет вектор-функция $X_1(t) = e^{2t}h^1$.

2) Для $\lambda_2 = 1$ и $h^2 = (a, b, c)^T$ имеем:

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} a - b + c = a, \\ a + b - c = b, \\ -b + 2c = c, \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = c, \\ b = c. \end{cases}$$

Так как для собственного значения $\lambda_2 = 1$ нашли один ($m = 1$) собственный вектор $h^2 = (a, a, a)^T$ (т. е. меньше его кратности $k = 2$), то, согласно [правилу 2](#), соответствующее ему решение можно искать в виде

$$X_2 = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} at + b \\ ct + d \\ et + g \end{pmatrix} \cdot e^t. \quad (808.1)$$

Подставив эти выражения для x , y и z в систему (808), получим:

$$\begin{cases} at + b + a = at + b - ct - d + et + g, \\ ct + d + c = at + b + ct + d - et - g, \\ et + g + e = 2et + 2g - ct - d. \end{cases}$$

Приравняв коэффициенты при одинаковых степенях t в правой и левой частях уравнений, будем иметь:

$$\begin{cases} a = a - c + e, \\ b + c = b - d + g, \\ c = a + c - e, \\ d + c = b + d - g, \\ e = 2e - c, \\ g + e = 2g - d, \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c = e, \\ a = e, \\ d = g - e, \\ b = e + g. \end{cases}$$

Пусть $e = C_2$, $g = C_3$. Получили, что коэффициенты многочленов в (808.1) зависят от двух произвольных постоянных C_2 и C_3 . Таким образом, собственному значению $\lambda_2 = 1$ соответствует решение:

$$X_2 = \begin{pmatrix} C_2 t + C_2 + C_3 \\ C_2 t - C_2 + C_3 \\ C_2 t + C_3 \end{pmatrix} \cdot e^t.$$

Сложив полученное решение и решение X_1 , умноженное на произвольную постоянную C_1 , получим общее решение системы (808):

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = C_1 e^{2t} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} C_2 t + C_2 + C_3 \\ C_2 t - C_2 + C_3 \\ C_2 t + C_3 \end{pmatrix} \cdot e^t. \quad (808.2)$$

Ответ:

$$x = C_1 e^{2t} + (C_2 t + C_2 + C_3) e^t, \quad y = (C_2 t - C_2 + C_3) e^t, \\ z = C_1 e^{2t} + (C_2 t + C_3) e^t.$$

Замечание. Полученное общее решение (808.2) можно представить в виде линейной комбинации:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = C_1 e^{2t} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + C_2 e^t \begin{pmatrix} t+1 \\ t-1 \\ t \end{pmatrix} + C_3 e^t \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Функции $e^{2t} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $e^t \begin{pmatrix} t+1 \\ t-1 \\ t \end{pmatrix}$, $e^t \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ являются линейно независимыми

решениями системы (808) и, следовательно, образуют ее фундаментальную систему решений. Действительно,

$$\begin{vmatrix} e^{2t} & (t+1)e^t & e^t \\ 0 & (t-1)e^t & e^t \\ e^{2t} & te^t & e^t \end{vmatrix} = e^{4t} \neq 0.$$

Заметим, что решение $e^t \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ соответствует собственному значению

$\lambda_2 = 1$. Здесь вектор $h^2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ является собственным (полагая $a = 1$).

Существует и другой метод построения линейно независимых функций, которые являются решениями системы (2) и соответствуют собственному значению λ матрицы A , имеющему кратность $k > 1$. Этот метод основан на построении **собственного вектора** и **присоединенного (присоединенных) к нему вектора (векторов)**. Количество присоединенных векторов равно разности ($p = k - m$). Собственный вектор h_0 и присоединенные к нему p векторов h_1, h_2, \dots, h_p находятся, решая уравнения:

$$\begin{aligned}
 Ah_0 &= \lambda h_0, \quad h_0 \neq 0, \\
 Ah_1 &= \lambda h_1 + h_0, \\
 Ah_2 &= \lambda h_2 + h_1, \\
 &\dots\dots\dots \\
 Ah_p &= \lambda h_p + h_{p-1}.
 \end{aligned}
 \tag{6}$$

Набору векторов $h_0, h_1, h_2, \dots, h_p$ соответствует $p + 1$ линейно независимых решений X_0, X_1, \dots, X_p системы $\dot{X}(t) = AX(t)$:

$$\begin{aligned}
 X_0 &= e^{\lambda t} h_0, \\
 X_1 &= e^{\lambda t} \left(\frac{t}{1!} h_0 + h_1 \right), \\
 X_2 &= e^{\lambda t} \left(\frac{t^2}{2!} h_0 + \frac{t}{1!} h_1 + h_2 \right), \\
 &\dots\dots\dots \\
 X_p &= e^{\lambda t} \left(\frac{t^p}{p!} h_0 + \frac{t^{p-1}}{(p-1)!} h_1 + \dots + \frac{t}{1!} h_{p-1} + h_p \right).
 \end{aligned}
 \tag{7}$$

Дополнение к задаче № 808

Найдем рассмотренным выше методом линейно независимые решения системы (808), соответствующие собственному значению $\lambda_2 = 1$. Так как для $\lambda_2 = 1$ имеем $k = 2$ и $m = 1$, то надо найти один ($p = k - m = 1$) присоединенный вектор $h_+ = (a_1, b_1, c_1)^T$ к собственному вектору $h^2 = (a, a, a)^T$, решая второе уравнение системы (6):

$$A \begin{pmatrix} a_1 \\ b_1 \\ c_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 \\ b_1 \\ c_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a \\ a \\ a \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} -b_1 + c_1 = a, \\ a_1 - c_1 = a, \\ -b_1 + c_1 = a, \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b_1 = -a + c_1, \\ a_1 = a + c_1. \end{cases}$$

Полагая $a = 1$ и $c_1 = 0$, будем иметь:

$$h^2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad h_+ = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Согласно формулам (7), построенным векторам соответствуют следующие линейно независимые решения системы (808):

$$h^2 \rightarrow X_2 = e^t \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad h_+ \rightarrow X_3 = e^t (t \cdot h^2 + h_+) = e^t \begin{pmatrix} t+1 \\ t-1 \\ t \end{pmatrix}.$$

Учитывая решение X_1 системы (808), соответствующее собственному значению $\lambda_1 = 2$, запишем общее решение:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = X = C_1 X_1 + C_2 X_2 + C_3 X_3 = C_1 e^{2t} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + C_2 e^t \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + C_3 e^t \begin{pmatrix} t+1 \\ t-1 \\ t \end{pmatrix}.$$

(Сравните решение с тем, которое было получено [первым способом](#))



Домашнее задание

[Ф] №№ 802, 818.