

Лекция 4

Модель популяции с неперекрывающимися поколениями

§1. Уравнение вида $N_{t+1} = F(N_t)$

1.1 Основные понятия

Для многих биологических популяций рост численности последовательных поколений происходит в дискретные моменты времени. Длина шага времени может сильно варьироваться в зависимости от конкретного биологического вида. Рассмотрим популяцию, в которой взрослые особи, оставляющие потомство в данном году, редко доживают или никогда не доживают до того, чтобы размножиться в будущем году. В основном, свойство неперекрывающихся поколений относится к различным видам насекомых, однолетних растений, многих рыб. Математические модели, описывающие динамику таких видов, должны выражать численность популяции в момент времени $t + 1$, которую обозначим как N_{t+1} , через численность в предыдущий момент времени t , которую обозначим как N_t (т. е. численность популяции через заданную единицу времени полностью определяется настоящим моментом времени). Это приводит к необходимости изучения динамических систем с дискретным временем в виде автономного разностного уравнения:

$$N_{t+1} = F(N_t), \quad t = 0, 1, 2, \dots \quad (1)$$

Уравнение (1) еще называют рекуррентным уравнением 1-го порядка или одномерным дискретным отображением.

Часто исследование уравнения (1) связано с получением ответа на такие вопросы: как ведут себя с ростом времени отдельные решения уравнения и как они зависят от изменения начальных данных.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1. *Решением уравнения (1) называется числовая последовательность $\{N_t\}$, $t = 0, 1, 2, \dots$, члены которой удовлетворяют уравнению (1).*

Решение уравнения (1) вида $N_t = N^* = const \quad \forall t = 0, 1, 2, \dots$ называют *стационарным*, а точку N^* – *положением равновесия* (или *точкой покоя*, *стационарной точкой*, *неподвижной точкой*).

Очевидно, все положения равновесия находятся как корни уравнения

$$N = F(N). \quad (2)$$

Если N_t , рассматриваемая как функция дискретной переменной t , является неотрицательной, то имеют смысл только неотрицательные корни уравнения (2).

Решение уравнения (1) можно наглядно продемонстрировать с помощью диаграммы и лестницы Ламерея (рис. 1). Абсциссы точек пересечения биссектрисы первой четверти координатной плоскости (N, y) с графиком функции $F(N)$ определяют равновесные состояния (рис. 1а). На рис. 1б показан способ нахождения значений N_t в последовательные моменты времени. Пусть в начальный момент $t = 0$ имеем $N = N_0$, тогда $F(N_0) = N_1$ задает значение N в момент времени $t = 1$. С помощью биссектрисы найденное значение «переносится» на ось N . Величина N_1 , в свою очередь, определяет значение $F(N_1) = N_2$, которое также отмечается на оси N с помощью биссектрисы. И так далее. На рис. 1б приведен пример, когда числовая последовательность – траектория развития популяции – сходится к равновесному состоянию, совершая затухающие колебания.




Рис. 1. Диаграммы Ламерея:

- а) определение положений равновесия; б) определение значений N_t (численности популяции) в последовательные моменты времени (лестница Ламерея)

1.2 Устойчивость положений равновесия

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2. Стационарное решение $N_t = N^*$, $t = 0, 1, 2, \dots$, уравнения (1) называется **устойчивым по Ляпунову**, если для любого $\varepsilon > 0$ существует $\delta(\varepsilon) > 0$, такое, что

$$|N_t - N^*| < \varepsilon \quad \forall t \geq 0, \quad \text{если} \quad |N_0 - N^*| < \delta. \quad (\star)$$

Если же для некоторого $\varepsilon > 0$ такого δ не существует, то решение N^* называют **неустойчивым**.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3. Стационарное решение $N_t = N^*$, $t = 0, 1, 2, \dots$, уравнения (1) называется **асимптотически устойчивым**, если оно устойчиво по Ляпунову и $\lim_{t \rightarrow +\infty} |N_t - N^*| = 0$, когда $|N_0 - N^*| < \delta$.

Так как разность $N_t - N^*$ характеризует отклонение точки N_t траектории от положения равновесия N^* в момент времени t , то определениям 2 и 3 можно дать следующую интерпретацию: малым отклонениям начальных данных соответствуют малые отклонения и в дальнейшем, а если при этом отклонения затухают с течением времени, то имеет место асимптотическая устойчивость. Для неустойчивости характерно нарастание отклонений.

В теории динамических систем асимптотически устойчивые положения равновесия (неподвижные точки) часто называют *аттракторами*¹ или *притягивающими точками*, а неустойчивые – *репеллерами* или *отталкивающими точками*.

Разложив функцию $F(N)$ в ряд Тейлора по степеням $N_t - N^* = \xi_t$ и отбросив члены порядка ξ_t^2 , построим соответствующее линеаризованное уравнение

$$\xi_{t+1} = F'(N^*)\xi_t, \quad (3)$$

где ξ_t имеет смысл отклонения от положения равновесия в момент времени t . Анализируя поведение решения уравнения (3), в некоторых случаях можно сделать вывод об асимптотической устойчивости положения равновесия N^* .

¹Множество точек в фазовом пространстве, к которому стремится изображающая точка с течением времени, называется *аттрактором*. С другой стороны, множество в фазовом пространстве, от которого изображающая точка «уходит» с течением времени, называется *репеллером*.

Так как уравнение (3) определяет геометрическую прогрессию, то общий член ее стремится к нулю при $t \rightarrow +\infty$, если знаменатель прогрессии, равный $F'(N^*)$, будет по модулю меньше 1. Следовательно, можно сформулировать следующие правила анализа положения равновесия на устойчивость.

Если $0 < |F'(N^*)| < 1$, то N^* – асимптотически устойчивое положение равновесия, причем если $0 < F'(N^*) < 1$, то отклонения монотонно затухают, если $-1 < F'(N^*) < 0$, то отклонения затухают, а траектория совершает затухающие колебания.

Если $|F'(N^*)| > 1$, то N^* – неустойчиво, причем имеет место монотонное нарастание отклонений, когда $F'(N^*) > 1$; если же $F'(N^*) < -1$, то траектория совершает колебания с нарастающей амплитудой.

Величину $\lambda = F'(N^*)$ называют *мультипликатором* неподвижной точки.

Сформулированные правила дают достаточные условия асимптотической устойчивости и неустойчивости положения равновесия. Если $|F'(N^*)| = 1$ или $F'(N^*) = 0$, то по поведению решения соответствующего линеаризованного уравнения нельзя сделать вывод об устойчивости положения равновесия и требуются дополнительные исследования. Точка N^* может быть аттрактором также и тогда, когда

$$|F'(N^*)| = 1.$$

В этом случае можно воспользоваться следующими теоремами [1].

Теорема 1. Пусть N^* – положение равновесия уравнения (1), в котором $F: R \rightarrow R$, и $F'(N^*) = 1$. Если

- 1) $F''(N^*) \neq 0$, то N^* неустойчиво (репеллер);
- 2) $F''(N^*) = 0$ и $F'''(N^*) > 0$, то N^* неустойчиво (репеллер);
- 3) $F''(N^*) = 0$ и $F'''(N^*) < 0$, то N^* асимптотически устойчиво (аттрактор).

Доказательство. 1) Так как $F''(N^*) \neq 0$, то в окрестности точки N^* график функции $F(N)$ имеет вид либо выпуклой кривой (если $F''(N^*) < 0$), либо вогнутой кривой (если $F''(N^*) > 0$) (рис. 1). Если $F''(N^*) < 0$, то $F'(N) > \alpha > 1$ для всех $N \in I_1 = (N^* - \varepsilon, N^*)$, $\varepsilon > 0$. Используя теорему о конечных приращениях, для $N \in I_1$ получим

$$|F(N) - N^*| = |F'(\xi)(N - N^*)| = F'(\xi)|N - N^*| > \alpha|N - N^*|, \quad \xi \in I_1.$$

Тогда, если $N_t \in I_1$ и $F(N_t) \in I_1$ для $t = 0, 1, \dots, N$, будем иметь

$$\begin{aligned} |N_t - N^*| &= |F(N_{t-1}) - N^*| = F'(\xi_1)|N_{t-1} - N^*| > \alpha|N_{t-1} - N^*| = \\ &= \alpha|F(N_{t-2}) - N^*| = \alpha F'(\xi_2)|N_{t-2} - N^*| > \alpha^2|N_{t-2} - N^*| = \dots \\ \dots &= \alpha^{t-1}|N_1 - N^*| = \alpha^{t-1}|F(N_0) - N^*| = \alpha^{t-1}F'(\xi_t)|N_0 - N^*| > \alpha^t|N_0 - N^*|, \\ &\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_t \in I_1. \end{aligned}$$

Полученная оценка для $|N_t - N^*|$ позволяет сделать вывод о том, что при малых начальных отклонениях, т. е. когда $|N_0 - N^*| < \delta$, отклонения $N_t - N^*$ в последующие моменты времени увеличиваются, так как $\alpha > 1$. Таким образом, не выполняются условия (*) определения 2 и поэтому точка N^* не устойчива.

Аналогично анализируется случай, когда $F''(N^*) > 0$, так как при этом $F'(N) > 1$ для всех $N \in I_2 = (N^*, N^* + \varepsilon)$, $\varepsilon > 0$.




Рис. 1. Геометрическая иллюстрация неустойчивости положения равновесия в случае, когда $F'(N^*) = 1$ и:
а) $F''(N^*) < 0$; б) $F''(N^*) > 0$.

Надо заметить, что в рассматриваемом случае можно говорить о полустойчивости положения равновесия. Так, если $F''(N^*) < 0$, точка покоя N^* притягивает те траектории, для которых $N_0 \in (N^*, N^* + \varepsilon)$. Если же $F''(N^*) > 0$, точка покоя N^* притягивает те траектории, для которых $N_0 \in (N^* - \varepsilon, N^*)$.

2) Если $F''(N^*) = 0$ и $F'''(N^*) \neq 0$, то в точке N^* график функции $F(N)$ имеет перегиб. При этом, так как $F'''(N) > 0$, то он имеет вид

выпуклой кривой, если $N \in I_1 = (N^* - \varepsilon; N^*)$, и вогнутой кривой, если $N \in I_2 = (N^*; N^* + \varepsilon)$ (рис. 2б). В этом случае $F'(N) > 1$ для всех $N \in I_1 \cup I_2$. Дальнейшие рассуждения аналогичны приведенным в первом пункте доказательства теоремы.




Рис. 1. Геометрическая иллюстрация анализа на устойчивость положения равновесия для случая, когда $F'(N^*) = 1$, $F''(N^*) = 0$ и:
а) $F'''(N^*) < 0$; б) $F'''(N^*) > 0$.

3) В точке N^* график функции $F(N)$ имеет перегиб. При этом, так как $F'''(N) < 0$, то он имеет вид вогнутой кривой, если $N \in I_1 = (N^* - \varepsilon; N^*)$, и выпуклой кривой, если $N \in I_2 = (N^*; N^* + \varepsilon)$. Тогда $0 < F'(N) < \alpha < 1$ для всех $N \in I = I_1 \cup I_2$, и при этом нетрудно установить, что, если $N_t \in I$ и $F(N_t) \in I$ для $t = 0, 1, \dots, N$ и $|N_0 - N^*| < \delta$, то

$$|N_t - N^*| < \alpha^t |N_0 - N^*| < \alpha^t \delta.$$

Таким образом, так как $0 < \alpha < 1$, то при малых начальных отклонениях отклонения в последующие моменты времени остаются малыми. А так как

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} |N_t - N^*| = 0,$$

то точка N^* является притягивающей. \square

Обозначим через $S(N)$ следующее выражение

$$S(N) = -2F'''(N) - 3(F''(N))^2. \quad (4)$$

Дифференциальное выражение (4) называют производной Шварца или шварцианом.

Теорема 2. Пусть N^* – положение равновесия уравнения (1), и $F'(N^*) = -1$. Если

- 1) $S(N^*) < 0$, то N^* асимптотически устойчиво (аттрактор);
- 2) $S(N^*) > 0$, то N^* неустойчиво (репеллер).

Доказательство. Заметим, что положение равновесия N^* уравнения (1) будет и положением равновесия уравнения

$$N_{t+2} = F(F(N_t)), \quad (5)$$

и при этом если оно будет аттрактором уравнения (5), то оно будет аттрактором и уравнения (1). Действительно, так как

$$(F(F(N)))' = F'(F(N)) \cdot F'(N),$$

то

$$(F(F(N)))'|_{N=N^*} = F'(F(N^*)) \cdot F'(N^*) = F'(N^*) \cdot F'(N^*) = (F'(N^*))^2,$$

и тогда

$$(F'(N^*))^2 < 1 \quad \Leftrightarrow \quad |F'(N^*)| < 1.$$

Поэтому, так как по условию теоремы $F'(N^*) = -1$, и при этом $(F(F(N)))'|_{N=N^*} = 1$, то для анализа на устойчивость точки N^* , рассматривая уравнение (5), можно применить теорему 1. Для этого найдем вторую производную:

$$\begin{aligned} (F(F(N)))'' &= (F'(F(N)) \cdot F'(N))' = \\ &= (F'(F(N)))' \cdot F'(N) + F'(F(N)) \cdot F''(N) = \\ &= F''(F(N)) \cdot F'(N) \cdot F'(N) + F'(F(N)) \cdot F''(N) = \\ &= F''(F(N)) \cdot (F'(N))^2 + F'(F(N)) \cdot F''(N). \end{aligned}$$

Ясно, что

$$(F(F(N)))''|_{N=N^*} = F''(N^*) \cdot (F'(N^*))^2 + F'(N^*) \cdot F''(N^*) = 0,$$

поэтому надо рассмотреть еще и производную третьего порядка:

$$\begin{aligned} (F(F(N)))''' &= (F''(F(N)) \cdot (F'(N))^2 + F'(F(N)) \cdot F''(N))' = \\ &= F'''(F(N)) \cdot (F'(N))^3 + 2F''(F(N)) \cdot F'(N) \cdot F''(N) + \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & +F''(F(N)) \cdot F'(N) \cdot F''(N) + F'(F(N)) \cdot F'''(N) = \\
 = & F'''(F(N)) \cdot (F'(N))^3 + 3F''(F(N)) \cdot F'(N) \cdot F''(N) + F'''(N) \cdot F'(F(N)).
 \end{aligned}$$

При $N = N^*$ получим:

$$\begin{aligned}
 (F(F(N)))'''|_{N=N^*} &= F'''(N^*) \cdot (F'(N^*))^3 + \\
 & + 3F''(N^*) \cdot F'(N^*) \cdot F''(N^*) + F'''(N^*) \cdot F'(N^*) = \\
 & = -2F'''(N^*) - 3(F''(N^*))^2 = S(N^*).
 \end{aligned}$$

Для завершения доказательства осталось применить результат теоремы 1 к выражению $S(N)$. \square

Рассмотрим еще один особый случай, когда $F'(N^*) = 0$. В малой окрестности точки N^* динамика отклонений решения уравнения (1) от положения равновесия N^* может быть описана уравнением

$$\xi_{t+1} = \frac{1}{2}F''(N^*)\xi_t^2, \quad t = 0, 1, 2, \dots$$

Обозначив через $\alpha = \frac{1}{2}F''(N^*)$, нетрудно установить, что

$$\xi_t = (\alpha\xi_0)^{2^t-1} \cdot \xi_0.$$

Тогда в случае $\alpha \neq 0$, если $|\xi_0| < \delta < \frac{1}{|\alpha|}$, будем иметь $|\alpha| \cdot |\xi_0| = \beta < 1$ и

$$|\xi_t| = \beta^{2^t-1} \cdot |\xi_0| < |\xi_0| < \delta \quad \forall t > 0.$$

При этом очевидно, что

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} |\xi_t| = 0.$$




Рис. 3. Геометрическая иллюстрация устойчивости положения равновесия для случая, когда $F'(N^*) = 0$ и:

а) $F''(N^*) < 0$; б) $F''(N^*) > 0$.

И, следовательно, справедлива следующая теорема.

Теорема 3. Пусть N^* – положение равновесия уравнения (1), в котором функция $F(N)$ дважды непрерывно дифференцируема. Если $F'(N^*) = 0$ и $F''(N^*) \neq 0$, то N^* асимптотически устойчиво.

Если и $F'''(N^*) = 0$, то в разложении правой части уравнения (1) по степеням $\xi_t = N_t - N^*$ следует отбрасывать члены уже порядка ξ_t^4 и выше.

Рассмотренные правила позволяют установить сходимость траекторий N_t к равновесию N^* лишь при малых начальных отклонениях, выясняя устойчивость в локальном смысле. Если имеет место сходимость траекторий N_t к равновесию N^* при любых начальных отклонениях, то положение равновесия является глобально асимптотически устойчивым. Глобальный характер поведения траекторий может быть установлен, например, отысканием соответствующих функций Ляпунова [2]. Заметим, что, если система имеет несколько положений равновесия, то ни одно из них точно не обладает глобальной устойчивостью.

1.3 Существование и устойчивость периодических решений

При анализе уравнения (1.1) кроме исследования положений равновесия выясняют наличие и характер устойчивости периодических решений (циклов). Это позволит получить представление о том, какие виды аттракторов присущи системе.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4. Решение $\{x_t^*\}_{t=0,1,2,\dots}$ уравнения (1.1), состоящее из конечного набора T ($T > 1$) различных значений, повторяющихся в строгой последовательности, т. е. когда:

- 1) $x_t^* = x_{t+T}^*$, $t = 0, 1, 2, \dots$,
- 2) $x_{t+j}^* \neq x_t^*$, $j = 1, 2, \dots, T - 1$,

называют *циклом длины T* (или *T -точечным циклом*, или просто *T -циклом*).

Цикл длины T будем записывать следующим образом:

$$(x_1^{<T>}, x_2^{<T>}, \dots, x_T^{<T>}).$$

Точки $x_i^{<T>}$, $i = \overline{1, T}$, образующие цикл, являются решением следу-

$$\dots, x_{k+T} = F(F^{T-1}(x_k)) = F^T(x_k),$$

то, учитывая условие цикла $x_{k+T} = x_k$, для x_k получим:

$$x_k = F^T(x_k).$$

Таким образом, любая точка цикла находится среди корней уравнения

$$x = \underbrace{F(F(\dots F(x)\dots))}_T = F^T(x). \quad (1.7)$$

Так как

$$\begin{aligned} F(x^*) &= x^*, & F(F(x^*)) &= F(x^*) = x^*, \\ F(F(F(x^*))) &= F(F(x^*)) = F(x^*) = x^*, \dots \\ \dots, F(\underbrace{F(\dots F(x^*)\dots)}_T) &= F^T(x^*) = x^*, \end{aligned}$$

то и все положения равновесия уравнения (1.1) являются корнями уравнения (1.7). Кроме того, аналогично можно доказать, что, если p является делителем T , то положения равновесия уравнения

$$x_{t+p} = F^p(x_t)$$

являются положениями равновесия уравнения

$$x_{t+T} = F^T(x_t),$$

а, значит, и корнями уравнения (1.7).

Таким образом, для нахождения цикла длины T , решая уравнение (1.7), следует, прежде всего, найти для уравнения (1.1) все положения равновесия и циклы всех длин, являющихся делителями T . Исключив указанные решения из множества корней уравнения (1.7), из оставшихся корней составляют цикл (циклы) длины T .

Вопрос о существовании циклов различной длины среди решений уравнения (1.1) впервые решен в работе украинского математика А. Н. Шарковского [4]. Для формулировки основного результата введем упорядочение натуральных чисел:

$$\begin{aligned} &3 \succ 5 \succ 7 \succ \dots \succ \\ &\succ 2 \cdot 3 \succ 2 \cdot 5 \succ 2 \cdot 7 \succ \dots \succ \\ &\succ 2^2 \cdot 3 \succ 2^2 \cdot 5 \succ 2^2 \cdot 7 \succ \dots \succ \\ &\succ 2^3 \cdot 3 \succ 2^3 \cdot 5 \succ 2^3 \cdot 7 \succ \dots \succ \\ &\succ \dots \succ \\ &\succ \dots \succ 2^5 \succ 2^4 \succ 2^3 \succ 2^2 \succ 2 \succ 1. \end{aligned}$$

В верхней строке выписаны в порядке возрастания все нечетные числа, кроме 1, во второй строке – произведения нечетных чисел (кроме 1) на 2, в третьей – произведения нечетных чисел на 2^2 , в k -й строке сверху – произведения нечетных чисел на 2^{k-1} . Наконец, в последней (нижней) строке представлены только степени двойки. Такое упорядочение натуральных чисел носит название **порядка Шарковского**. Каждое натуральное число в этом порядке появляется только один раз.

Теорема 1.4 (А. Н. Шарковский, [4]). Пусть $F: R \rightarrow R$ – непрерывная функция и пусть уравнение (1.1) имеет цикл длины k . Тогда уравнение (1.1) имеет цикл длины m для всех таких m , что $k \succ m$ в указанном выше порядке.

Из этой теоремы следует, что если уравнение (1.1) не имеет циклов длины 2, то оно вообще не имеет никаких циклов. А если уравнение (1.1) имеет цикл длины 3, то оно имеет цикл любой длины. Но в теореме Шарковского ничего не говорится об устойчивости циклов.

Выясним, когда в случае существования, цикл является притягивающим (аттрактором). В силу определения цикла, каждая из точек $x_i^{<T>}$, $i = 1, 2, \dots, T$, является неподвижной точкой T -ой итерации отображения

$$F^T(x) = \underbrace{F(F(\dots F(x)\dots))}_T,$$

а значит, и положением равновесия уравнения

$$x_{t+T} = F^T(x_t). \quad (1.9)$$

Действительно, для точки $x_1^{<T>} = x_1$, учитывая только условия (1.6), имеем

$$x_1 = F(x_T) = F^2(x_{T-1}) = F^3(x_{T-2}) = \dots = F^T(x_{T-(T-1)}) = F^T(x_1).$$

Аналогично проводится доказательство и для остальных точек цикла. И поэтому вопрос об устойчивости цикла сводится к вопросу об устойчивости положений равновесия уравнения (1.9), которые являются точками цикла. А так как уравнение (1.9) является разностным уравнением первого порядка, когда t изменяется с шагом, равным T , то для исследования на устойчивость надо определить мультипликатор неподвижной точки x_k уравнения (1.9):

$$\lambda_k^{<T>} = (F^T(x))' \Big|_{x_k}.$$

Докажем, что его значение не зависит от точки цикла. По правилу дифференцирования сложной функции для мультипликатора точки цикла x_1 будем иметь:

$$\begin{aligned}\lambda_1^{<T>} &= F'(F^{T-1}(x_1))(F^{T-1}(x_1))' = F'(x_T)(F^{T-1}(x_1))' = \dots \\ &= F'(x_T)F'(x_{T-1})F'(x_{T-2}) \cdot \dots \cdot F'(x_2)F'(x_1).\end{aligned}$$

Для любой другой точки цикла выражение для мультипликатора совпадает с полученным выражением с точностью до порядка сомножителей и равен

$$\lambda^{<T>} = \prod_{j=1}^T F'(x_j) \quad \forall k = 1, 2, \dots, T. \quad (1.10)$$

Величину $\lambda^{<T>}$ называют *мультипликатором* цикла. Он показывает, как изменяются малые возмущения за период цикла.

В зависимости от значения мультипликатора цикла вводится следующая терминология. Цикл $(x_1^{<T>}, x_2^{<T>}, \dots, x_T^{<T>})$ называют *притягивающим*, *отталкивающим* или *нейтральным*, если соответственно:

$$|\lambda^{<T>}| < 1;$$

$$|\lambda^{<T>}| > 1;$$

$$|\lambda^{<T>}| = 1.$$

Наряду с равновесием и циклами можно выделить еще один тип поведения решения разностного уравнения (1.1). Это так называемые *хаотические* траектории, т. е. непериодические последовательности $\{x_t\}$, $t = 0, 1, \dots$, и даже, более того, не стремящиеся ни к какому притягивающему равновесию или циклу. Существует связь между наличием цикла периода 3 и существованием хаотических решений. Ее установили американские математики Т. Ли и Дж. Йорк. Свой результат они опубликовали в 1975 г. в работе, озаглавленной «Период три рождает хаос»². Независимо от А. Н. Шарковского, Т. Ли и Дж. Йорк доказали следующую теорему.

Теорема 1.5. *Если уравнение (1.1) обладает трехточечным циклом,*

²Li T. Y. and Yorke J. A. Period three implies chaos. American Mathematical Monthly, **82**, 1975, 187–204.

то оно имеет также и решения любого периода ω , кроме того, существует несчетное множество начальных значений x_0 , при которых решение не стремится ни к одному из этих циклов, т. е. хаотично [2, 3].

Литература

1. Бобровски Д. Введение в теорию динамических систем с дискретным временем. – М.-Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика»; Институт компьютерных исследований, 2006. 360 с.
2. Свирежев Ю. М. Устойчивость биологических сообществ / Ю. М. Свирежев, Д. О. Логофет. М.: Наука, 1978.
3. Шапиро А. П. Рекуррентные уравнения в теории популяционной биологии / А. П. Шапиро, С. П. Лупшов М.: Наука, 1983. 133 с.
4. Шарковский А. Н. Существование циклов непрерывного преобразования в себя / А. Н. Шарковский Украинский математический журнал, 16(1), 1964, С. 61–65.